

PLANTES NOUVELLES, RARES OU CRITIQUES
DES SERRES DU MUSÉUM

Par A. GUILLAUMIN.
PROFESSEUR AU MUSÉUM

124. — *Philodendron Leichtlinii*.

Depuis 1934 existe dans les collections du Muséum une Aracée donnée par Dutrie (f. 325, 1934) sous le nom de *Philodendron Leichtlinii*.

Ce binôme figure sur des *Catalogues* de Van Houtte postérieurs à 1929, notamment dans celui de 1932, mais sans diagnose. Dans le *Bon Jardinier*, 151^e édition (1947), p. 1648, J. Chantrier le décrit ainsi :

« **Leichtlinii** Hort. Amér. cent. Tige grêle, sarment. Flls. de forme elliptique, convexes, d'un beau vert émeraude mat, largement perforées comme à l'emporte-pièce de chaque côté de la nervure médiane jusqu'auprès de la périphérie. »

Bien que la plante n'ait pas fleuri, ses feuilles correspondent très exactement à la figure qu'Engler (*Pflanzenreich* IV, 23, B, fig. 41) donne des variétés du *Monstera pertusa* de Vriese = *Dracontium pertusum* L. = *Monstera Lechleriana* Schott. On peut se demander si *Leichtlinii* ne serait pas une déformation de *Lechleriana* s'appliquant à une forme jeune de *M. pertusa*. Les horticulteurs modernes ayant pensé à leur collègue Leichtlin plutôt qu'au botaniste wurtembourgeois Lechler mot à Guayaquil en 1856 ?

125. — *Aloe x panormitana* Guillaum. hybr. nov.

Breviter caulescens (10 cm) ; *folia* circa 15, *dense rosulata, patentia, apice recurvata, deltoideo-lanceolata. circa* 20-25 cm. × 6-8 cm., *supra plana sed apicem versus uno latere quam aliud proximiore carinata et sparsissime brevissimeque aculeata, subtilis vix convexa*, 1 cm. *crassa, succo haud flavescente, lacte viridia, maculis paucis, albis, oblongis, sparsis, marginibus aculeis albis, 2 mm. longis, circa 8 mm. distantibus. Inflorescentia* 65 cm. *alta, erecta, racemose furcata, pedunculo circa 20 cm. longo, basi compresso, nudo, ramis 35-40 cm. longis, bracteis vacuis lanceolatis 1,5-3 cm. longis, cuspidatis, membranaceis, brunneis e basi vestitis, pedicellis bractea 2-plo longioribus (ad 2 cm. longis), erectis, perigonio 2,5 cm. longo, basi dilute roseo, apice viride, cylindrico, basi rotundato et haud stipitato, segmentis usque ad medium connatis, staminibus valde inclusis, ovarium obtusum, stylo exserto.*

Reçu en graines du Jardin botanique de Palerme (f. 134, 1933)
sous le nom d'*Aloe brevifolia* var. *serra*.

Est vraisemblablement un hybride entre cette espèce et une plante
du § *Saponariae* ; rappelle en effet l'*A. brevifolia* par ses bractées,
ses fleurs et l'aspect de la grappe mais en diffère tout à fait par ses
feuilles éparses maculées qui font penser plutôt à celles de l'*A.*
zebrina Bak. Les dents des bords des feuilles ressemblent plus à
celles de l'*A. brevifolia* que de l'*A. zebrina*, toutefois les plantes
provenant du même semis présentent des dents marginales des
feuilles brunes et non blanches.